

と書き直すのになんの困難もない。こうして、

$$x^2 + 2(k-2)x + k = 0$$

$$\Leftrightarrow \{x + (k-2)\}^2 = k^2 - 5k + 4$$

がえられるが、この最後の方程式では未知数の散らばりがまったくない。つまり、 $x + (k-2)$ という未知な数があるのだが、それは2乗すると $k^2 - 5k + 4$ になるような数だといっているわけだ。いってしまえばコロンブスの玉子だが、こんなことを自力で考え出したひとの数学力は並大抵のものではない。

ところで、この方程式の右辺 $k^2 - 5k + 4$ が負の数なら、 $x + (k-2)$ は実数でありえない。実数なら2乗すれば必ず正か0にあるからである。こうして、問題の2次方程式が実数解をもつ条件は

$$k^2 - 5k + 4 \geq 0 \quad \Leftrightarrow k \leq 1 \quad \text{または} \quad 4 \leq k$$

となる。

“判別式 ≥ 0 ” とひとことでいえばえられる結果を、ずいぶんと長々と説明してやっと手にしたように見えるかも知れない。しかし、そうではないことは実際に解答を書いてみればわかる。

【解答】 $x^2 + 2(k-2)x + k = 0$

$$\Leftrightarrow (x + k - 2)^2 = k^2 - 5k + 4$$

が実数解をもつ条件は

$$k^2 - 5k + 4 \geq 0 \quad \Leftrightarrow (k-1)(k-4) \geq 0$$

$$\Leftrightarrow k \leq 1 \quad \text{または} \quad 4 \leq k$$

で、このとき方程式の解は

$$x + k - 2 = \pm \sqrt{k^2 - 5k + 4}$$

$$\Leftrightarrow x = -k + 2 \pm \sqrt{k^2 - 5k + 4}$$

これらがいずれも -1 以下となる条件は、この2解の大きい方について

$$-k + 2 + \sqrt{k^2 - 5k + 4} \leq -1$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{k^2 - 5k + 4} \leq k - 3$$

$$\Leftrightarrow k^2 - 5k + 4 \leq (k-3)^2 \quad \Leftrightarrow k \leq 5$$

が成り立つことであって、求める k の値の範囲は

$$4 \leq k \leq 5 \quad \square$$

しかし、大切なことは解答の長短ではなく、ある分野の公式はそれを導く過程に典型的で学ぶべきことが多いもので、結果としての公式は搾り滓である、という事実気付くことである。いまの場合、“判別式 ≥ 0 ” という結果は、“平方完成” によって散らばっている

未知数を1ヶ所に集めるという、実り多い考え方の残滓にすぎないのだ。

実際、散らばったものを1ヶ所に集めるという式変形の方法性は、平方完成にとどまらず有効である。例えば分数関数

$$f(x) = \frac{x}{x+1} \quad (x > 0)$$

は、 x が分母と分子に散らばっているため x が増えるとき全体として増えるのか、減るのかわかりづらい。しかし、

$$f(x) = \frac{x}{x+1} = \frac{(x+1)-1}{x+1} = 1 - \frac{1}{x+1}$$

と式変形すれば、 x が増えるとき $\frac{1}{x+1}$ は減るから全体として $f(x)$ は増えるとわかってしまう。つまり、散らばったものを1ヶ所に集めたいという方向性は2次関数という範囲をこえて普遍的に有効なのである。

2次関数

判別式が顔をだすのは2次方程式の問題に限られているわけではない。まず次の例題を見ていただきたい。

例題2. $f(x) = x^2 + 2ax - 3a$ について、次の各設問に答えよ。

- (1) $a = 1$ のとき、方程式 $f(x) = 0$ を解け。
- (2) 任意の実数 x について、 $f(x) > 0$ となるような a の値の範囲を求めよ。
- (3) $0 \leq x \leq 1$ の任意の x に対して、 $f(x) > 0$ となるように a の値の範囲を求めよ。

／84 順天堂大・体育

(1) はなんの問題もないが(2)では以下のような答案を今でも目にすることがある。

任意の x について $f(x) > 0$ となる条件は

$$D/4 = a^2 + 3a < 0$$

$$\therefore a(a+3) < 0$$

よって、

$$-3 < a < 0$$

わたしが高校生するときも、次の形の定理として習った記憶がある。

2次関数が常に定符号であるための条件は
判別式 < 0

そして、このような問題にめぐりあうごとに、納得するために、グラフを思い浮かべ

2次関数が定符号
 \Leftrightarrow 対応する2次方程式が虚数解をもつ
 \Leftrightarrow 判別式 <0

といういいかえを強いられていたことを思い出す。

しかし、どうせ2次関数でグラフを思い浮かべるのなら、その頂点の座標を計算するはずで

$f(x) = x^2 + 2ax - 3a = (x+a)^2 - a^2 - 3a$
 と平方完成を行うはずだ。

そして、グラフを描いてみれば、

任意の x について $f(x) > 0$
 $\Leftrightarrow y = f(x)$ のグラフの頂点の y 座標 >0

がひとりで理解される。

“判別式 <0 ”という条件がこの“頂点の y 座標 >0 ”のいいかえであることに気付いたときほど馬鹿馬鹿しい思いをしたことはない。こんなに目で見ても明らかなことを、なぜ難しくいいかえていたのか。

“頂点の y 座標 >0 ”には視覚的イメージがともなうのに“判別式 <0 ”にはイメージが何もないのである。

こんなことを本気で教えている人がいるということも不思議といえば不思議なのだが、迷惑なのは、かつてのわたしのようにそれをまともに受け取る生徒のほうである。

問題にもどろう。われわれはさきほど

$f(x) = x^2 + 2ax - 3a = (x+a)^2 - a^2 - 3a$
 という“平方完成”を行ったが、それはなんのためであったのか？もとの

$$f(x) = x^2 + 2ax - 3a$$

の形の2次関数は、動く x が2ヶ所に散らばっているために、例えば x が増えたときに $f(x)$ が増えるのか減るのか、そのあたりが不明である。しかし、“平方完成”した

$$f(x) = (x+a)^2 - a^2 - 3a$$

の形では、この式で動くものは $(x+a)^2$ だけになっている。このおかげで $f(x)$ は $(x+a)^2$ が大きくなるほど大きく、小さいほど小さいということが読みとれる。こうして、 $x = -a$ とすることで $(x+a)^2$ (≥ 0)の値を最も小さくできて、そこが $y = f(x)$ のグラフの頂点であることがわかったのである。

判別式は(2)のような問いに対してはもっと分

が悪い。この方法ではこの問いには答えられないのだ。しかし、“平方完成”を基本におく解法では、まったく同じ方針のもとで問題に対処できる。キーとなるのは

任意の x について $f(x) > 0$
 $\Leftrightarrow f(x)$ の最小値 >0
 (みんなが正 \Leftrightarrow 一番小さい人でも正)

たったこれだけのいいかえである。

“平方完成”と上のいいかえとを組み合わせ、これに起こっていることを数直線上で分析する仕方を学べば(以下の解答で行われる)、この手の問題に対する強力な解法を手にすることができる。では解答を書いてみよう。

【解答】 (1) $a=1$ のとき

$$f(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 + 2x - 3 = 0$$

$$(x+1)^2 = 4 \Leftrightarrow x+1 = \pm 2$$

$$\Leftrightarrow x = 1 \text{ または } x = -3$$

(2) $f(x) = (x+a)^2 - a^2 - 3a$ により

$$f(x) \text{の最小値} = -a^2 - 3a$$

よって、

$$\begin{aligned} \text{任意の } x \text{ について } f(x) > 0 \\ \Leftrightarrow f(x) \text{の最小値} > 0 &\Leftrightarrow -a^2 - 3a > 0 \\ \Leftrightarrow a(a+3) < 0 &\Leftrightarrow -3 < a < 1 \end{aligned}$$

(3) $f(x) = (x+a)^2 - a^2 - 3a$ から、 x が $0 \leq x \leq 1$ の範囲を動くとき、数直線上で点 x が点 $-a$ に近いほど $f(x)$ の値は小さい。したがって、 $f(x)$ の

最小値を $m(a)$ とすれば、右図とから

$m(a)$

$$m(a) = \begin{cases} f(0) & (-a \leq 0) \\ f(-a) & (0 \leq -a \leq 1) \\ f(1) & (1 \leq -a) \end{cases}$$

$$= \begin{cases} -3a & (0 \leq a) \\ -a^2 - 3a & (-1 \leq a \leq 0) \\ 1 - a & (a \leq -1) \end{cases}$$

よって、 $b = m(a)$ のグラフは右図で、求める a の値の範囲は

$$a \leq 0$$

はやく、すべての高校生が“判別式”の呪縛から逃れられることを願っている。

宮崎 天平

